Le faire à courtoisie

N° 31

1

ACADÉMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
C. 26 N 3255

Observations sur l'hydrocèle de la Tunique vaginale du testicule. par

Frederic Cretien Winslow.
de la société de Medecine de Copenhague
Chirurgien pensionné au Service de
S. M. le roy de Dannemarck 55.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Coté quatre feuillets
Le Bibliothécaire
A. Dureau

ARC 18 d 5 n° 31

Les differentes Methodes indiquées de guerir radicalement l'hydrocele par epanche=
=ment dans la tunique vaginale du testicule, les avantages les succes que chaque
Auteur trouvent dans sa methode, les inconveniens et les suites facheuses repro=
=chés par des practiciens, mettent le Chirurgien dans l'embarras de choisir par=
=mi ces methodes celle qu'on doit preferer; c'est ce qui m'a engagé de communiquer
à l'Academie quelques observations de cures obtenues par l'incision.

I Observation. Un palfrenier ayant reçu en travaillant un coup de pied d'un
cheval fougeux dans la region du pubis, fut traité quelques jours par un
Chirurgien mais les moyens necessaires pour continuer la geurison chez lui
manquoint, il fut obligé de se faire transporter à l'hopital royal Frederic
de Copenhague. jusqu'alors on lui avoit ordonné les remedes generaux
ou la Methode antiplogistique, les parties genitales ainsi que les voisinees
etoient encore enflamées et tumifiées on continua les fomentations resolutives
avec des compresses et le suspensoire, les saignees et les remedes usites et
connus en pareils cas furent appliques, quelques jours apres la fievre cessa
l'engorgement inflamatoire disparut et les douleurs diminuerent beaucoup
mais en meme tems il resta une tumeur autour du testicule droit, les
fomentations resolutives furent employées sans succes, on apliqua un cataplasme
fait avec le mie du pain et l'eau vegeto-mineral de Goulard; par la conti=
=nuation de ce dernier la tumeur resta indolente, circonscrite de forme
ovale, la surface egale fluctuante avec la couleur naturelle à la peau,
vers la partie posterieure et superieure on sentit tres aisement une partie
du testicule en deprimant le fluide contenu, deux mois se passerent
sans amelioration sensible quoiqu'on persistat dans l'usage de Topique.
à cette epoque on ne vit d'autre secour que l'evacuation du liquide
contenu, je fis en presence de Messieurs les Directeurs de l'hopital

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

la punction à la partie la plus declive de la tumeur, on croyoit que ce moyens là suffiroit, mais il ne sortit par la canule que quelques cuilleries d'une serosité rougeâtre et la plus grande partie de la tumeur subsistoit encore, j'employai sans aucun effet une injection emolliente pour delayer la partie restante crainte d'irriter plus longstems ces parties tres sensibles d'elles memes on prit la resolution de faire sur la renure de la canule du troiquart avec un Bistourie une incision de bas en haut en suivant la grandeur de la tumeur; on trouva le testicule sain et environné d'un coagulum tenace et filamenteux formé par du sang epanché, J'apliquai entre le sac et le testicule une bandelette ~~et par dessus une plumaceaux~~ du linge introduite avec une sonde, j'aprochois les bords de la playe ~~pour~~ pour couvrir le testicule et par dessus une plumaceaux trempé dans de l'huile et enfin des compreses humectes avec du vin tiede le tout etoit soutenus par un suspensoir convenable, le repos la diete du coté du malade furent bien observes, quelques heures apres l'operation le malade fut saigné, il comencia à se plaindre des douleurs, on lui ordonna un opiate à petites doses jusqu'a l'effet, ⓐ quelques jours apres on aplica des cataplasmes pour accelerer

---

ⓐ apres les operations qui ont interessé de parties tres sensibles j'ai toujours vu donner l'opium avec succes, il amene le calme et le repos fait cesser l'eretisme qui regne dans toute l'habitude du corps peut même prevenir les convulsions qu'on a vu devenir funestes dans ces cas : j'en ai vu un exemple frapant. Mr. Callisen Doc. & profes. en chirurgie &c. avoit extirpé une tumeur cystique de la grandeur d'un oeuf de pigeon qui etoit placé ou le nerf frontal sort par le trou surcillier, il fut obligé de faire la section de ces parties nerveuses pour emporter cette tumeur, il parut apres l'operation des symptomes precurseurs des convulsions le trismus etoit meme declaré, je fus chargé de demeurer aupres du malade et du lui donner de quart d'heure en quart d'heure selon les circonstances de l'opium, apres quelques doses,

M. Chopart commissaire nommé par l'Academie pour examiner ces observations a appris de M. Winslow que ~~le dans~~ le calmant etoit le laudanum liquide donné à la dose de quinze gouttes, tous les quarts d'heure.

la Supuration du Sac en pensant le malade j'avois toujours soin en renouvellant les bandelettes quelles fussent bien apliquer jusqu'au fond du sac, de sorte que le pus de la partie posterieure du sac supure put avoir une ecoulement libre pour empecher les abcesses qui s'en suivent souvent, les pansemens furent changés selon les circonstances et tres peu du tems apres le malade quitta l'hopital en parfaite santé. J'ai vu le malade plus d'un ans apres l'operation et quoique exposé à un travail penible comme de courir souvent la poste à cheval il ne ressentoit plus le moindre incommodité. (6)

II. Observation. un homme agé de 30 ans etoit incommodé depuis 4 ans d'une hydro-=cele, son volume surpassoit la grandeur du poignet, je l'engageai à entrer à l'hopital pour lui donner des soins plus particuliers apres l'avoir preparé pendant quelques jours, je fis l'incision de haut en bas en me servant d'un bistourie et d'une sonde cannelée en suivant la longeur de la tumeur je mis en usage les regles, qui exigoient les circonstances et j'eus encore la satisfaction de voir le malade parfaitement queri.

III. et IV. Mr. Behrens Chirurgien major de l'hopital royal Frederic, fit la meme operation dans un jour sur deux malades, sa santé delicate ne lui ayant pas permis de leurs donner ses soins il m'en confia le traitement, j'eus encore la satisfaction de voir queris ces deux malades, dont l'un avoit subi deux fois la punction.

= les symptomes ne paroisoient pas ceder, craignant de porter l'opium à une dose trop forte je fus rasuré par Mr. Callisen qui ne voyoit que cette ressource, en effet apres quelques doses reiterés les Symptomes s'apaiserent et le malade tomba dans un someil qui fut salutaire. certainement on employa en meme tems les saignees les fomentations les medicamens antiphlogistiques &c.

(6) on voit que ce premier cas, n'est qu'un varieté de la methode qui consiste à faire une incision avec un Bistourie.

V. observation. Mr. Hennings Conseiller de Justice, professeur royal d'anatomie et Di=recteur general de la Chirurgie, fit la meme operation sur un homme de lettres tres distingue qui avoit été longstems attaque d'un hydrocele, j'assistai à l'operation, je traitai le malade de concert avec lui, il guerit aussi heureusement que les malades precedans.

VI observation. Mr Callesen Doc. en Med. et profess. en Anat. et Chirurg. eut la meme succes sur un malade qu'il opera par l'incision, il ajouta seulement aux procedes cy dessus les scarifications du sac qui etoit tres epais insensible et presque inorganique

VII. enfin J'ai vu Mr Kölpin Conseiller de Justice et premier chirurgien de S. M. le Roy de Dannemarck, traiter et querir de meme une personne incom=modee d'un hydrocele.

Je ne pretens pas donner l'exclusion à d'autres Methodes qui ont été practiques avec succes et qui sont recomendés dans les ouvrages de Messieurs de l'academie de Chirurgie de Pott Else &c. mais etant jeune et peu experimenté, on est toujour tenté de suiver ses maitres et principalement ce qu'on a vu practiquer avec succes. Quelque chose qu'on puisse opposer contre la cure par l'incision, elle a pourtant des avantages sur les autres methodes.

Les causes generales de l'hydroceles sont ordinairement des contusions, il est à presumer que le testicule a pu souffrir aussi tant par la contusion que par la maceration de la serosité acre (quoique cela arive tres rarement). par consequent on ne voit ni par la methode du seton ni par la caustique ni par les injections l'état du testicule.
la Methode de l'injection et du seton ont pour but de produire une infla=mation totale du sac et du testicule, pour leurs faire contracter une parfaite adharence ou pour mieux dire faire un corps de ces deux parties. mais si le sac etoit inveteré par consequent epais insensible ou peut-etre

qu'il devienne totalement inorganique, l'irritation n'agit qu'a raison des parties plus ou moins sensible, ce qui rend l'inflamation inegale et la fait souvant manquer en differents endroits, donc le pretendu adherence n'est jamais sure et certaine.

On oppose principalement contre l'incision, quelle a ete suivie des symptomes les plus graves memes mortels, observés par les plus grands maitres de l'art, mais l'usage de temponer la playe tres frequent parmi les anciens n'a-t-il pas pu causer l'irritation, l'inflamation, la denudation du testicule et la mort subite, et peut-etre nos ancetres n'ont pas osé l'ordonner l'opium a une dose suffisante pour calmer l'irritation produite dans toute le systeme nerveux.

L'accueil favorable que l'Academie a bien voulu faire aux observations que j'ai deja eu l'honneur de lui presenter, me fait hazarder de lui presenter celles cy, je serois trop flatté si elles pouvoient lui etre egalement agreables.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE